

دليل منع الحمل



دليل منع الحمل مُقدمة

حيث إن هناك العديد من وسائل منع الحمل المختلفة، فقد قمنا بتأليف هذا الكتيب لنعطيك لمحة عامة عن مختلف الوسائل. وهذا سيجعلكِ تقررين وسيلة منع الحمل الأفضل بالنسبة لك بسهولة ويسر. فهو يساعدكِ على معرفة المزيد عن مكوناتها، ومدى فعاليتها وتكلفتها، والمدة التي يتعين عليكِ استخدامها خلالها وذلك قبل أن تتخذى قرارك.

من المهم معرفة أن الواقي الذكري يحمي فقط من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا. وحتى إذا كنت تستخدمين وسيلة أخرى لمنع الحمل، فإننا ننصح باستخدام الواقي الذكري معها كذلك إذا كنتِ بصدد إقامة علاقة مع شريك جديد. يمكنكِ طلب الواقي الذكرى مجانًا من الموقع www.gratiskondomer.no

إذا كانت لديكِ أية أسئلة، يمكنكِ الدردشة معنا على موقعنا www.sexogsamfunn.no

جميع المعلومات الواردة في هذا الكتيب خضعت لمراقبة الجودة من قبل العاملين بمنظمة Sex og samfunn وجامعة أوسلو.

أوسلو، نوفمبر 2016

أنواع وسائل منع الحمل

وسائل منع الحمل غير الهرمونية

المدة	الوسيلة	تعرفي على المزيد
5 سنوات	اللولب الرحمي النحاسي	الصفحة 8
في كل مرة تمارسين فيها الجنس	الواقي الذكري	الصفحة 10

وسائل منع الحمل الهرمونية المحتوية على البروجيسترون فقط

			تعرفي على
المدة	الوسيلة	الاسمر التجاري	المزيد
3 أو 5 سنوات	اللولب الرحمي الهرموني	مايرينا (Mirena) (5 سنوات)، ليفوسيرت (Levosert) (3 سنوات)، جايديس (Jaydess) (3 سنوات)	الصفحة 12
3 سنوات	غرسات منع الحمل	نكسبلانون (Nexplanon)	الصفحة 14
3 أشهر	حقن منع الحمل	دیبو بروفیرا (Depo-Provera)	الصفحة 16
24 ساعة	أقراص البروجيسترون	سیرازیت (Cerazette)، دیزوجیستریل (Desogestrel) أوریفارم (Orifarm)، کونلوداج (Conludag)	الصفحة 8

وسائل منع الحمل الهرمونية المحتوية على الإستروجين والبروجستيرون

تعرفي على			
المزيد	الاسم التجاري	الوسيلة	المدة
الصفحة 20	نوفارینج (NuvaRing)	الحلقات المهبلية	3 أسابيع
الصفحة 22	إيفرا (Evra)	لصقات منع الحمل	1 أسبوع
الصفحة 24	ميكروجينون (Microgynon)، أورالكون (Oralcon)، لويت (Loette)، سينفيز (Synfase)، ميرسيلون (Mercilon)، مارفيلون (Marvelon)، ياسمين (Yasmin)، ياسمينيل (Yasminelle)، ياز (Yaz)، كلايرا (Qlaira)، زولي (Zoely	أقراص منع الحمل	24 ساعة

الأنواع المختلفة من وسائل منع الحمل

المزايا والعيوب

هناك مزايا وعيوب لجميع وسائل منع الحمل. وميزة وسائل منع الحمل الهرمونية، من أي نوع، هي أنها، في كثير من الأحيان، تقلل النزيف والألم أثناء فترة الحيض. وثمة فارق هام بين تلك الوسائل يتمثل في المدة التي يتعين استخدام الوسيلة طيلتها.

وسائل منع الحمل غير الهرمونية

لا تؤثر وسائل منع الحمل غير الهرمونية على الإياضة، لذلك فإنها لا تُغير من نمط الحيض المعتاد لديك.

وميزة هذه الوسائل هي أنك لا تحتاجين إلى التفكير في الآثار الجانبية التي قد تسببها الهرمونات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الواقي الذكري يحميكِ من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا. وعيب هذه الوسائل أنك لن تتمكني من التحكم في الحيض لديك، وقد يتسبب اللولب الرحمي النحاسي في حدوث نزيف شديد وغزير وزيادة حدة تقلصات الحيض بصورة أسوأ من ذي قبل.

وسائل منع الحمل الهرمونية المحتوية على البروجيسترون فقط

تحتوي هذه الوسائل على هرمونات ممائلة لهرمون البروجيسترون الأنثوي. يعمل هرمون البروجيسترون على منع عملية الإباضة، مما يزيد من صعوبة دخول الحيوانات المنوية إلى الرحم ، كما يجعل بطانة الرحم رقيقة أكثر لمنع أية بويضات مخصبة من الالتصاق بها.

وستعود دورة الإباضة لديك لطبيعتها بسرعة بمجرد توقفكِ عن تناول هذه الوسيلة. والاستثناء الوحيد من ذلك هو حقن منع الحمل: فغالبًا ما يمر وقت طويل قبل أن تعود دورة الإباضة لديك إلى طبيعتها مرة أخرى. وميزة وسائل منع الحمل المحتوية على هرمون البروجيسترون فقط هي أنها لا تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم، أمراض القلب والأوعية الدموية أو سرطان الثدي. لذلك، يمكن للسيدة الممنوعة من تناول هرمون الإستروجين استخدام وسائل منع الحمل المحتوية على هرمون البروجيسترون فقط.

ينقطع الطمث لعدة أشهر لدى العديد من السيدات بعد استخدامهن لوسيلة منع الحمل، وهذا الأمر لا يدعو بتاتًا للقلق. لكن تكمن المشكلة في أنك لا تستطيعين السيطرة على النزيف، والبعض مِنكُن يتعرض لنزيف غير منتظم أو التبقيع (نزول قطرات من الدم).

وسائل منع الحمل الهرمونية المحتوية على الإستروجين والبروجستيرون كليهما

تُعرف وسائل منع الحمل هذه باسم أقراص منع الحمل الفموية المُركبة لكونها تحتوي على مزيج من الهرمونات المُماثلة للهرمونات الجنسية الأنثوية - الإستروجين والبروجيسترون. وهي تمنع الحمل عن طريق منع عملية التبويض وإعاقة الحيوانات المنوية من الدخول إلى الرحم. وهذا التأثير مؤقت. وستعود دورة الإباضة لديك لطبيعتها بسرعة بمجرد توقفكِ عن تناول هذه الوسيلة.

وميزة وسيلة منع الحمل المُركبة تتمثل في كونها تمكنكِ من التحكم في الحيض بشكل جيد، بما يعني أنه يمكنك أن تقرري الإحاضة في الوقت الذي تريدينه. إذا التزمتِ بالتعليمات بأخذ فترة راحة من الأقراص الهرمونية لمدة أسبوع واحد كل شهر، فسوف تحيضين كل شهر. ويمكنك أيضًا "تخطي" الحيض بعدم أخذ فترة الراحة، أما عيب وسائل منع الحمل المُحتوية على هرمون الإستروجين فيتمثل في كونه قد يُسبب زيادة طفيفة في خطر الإصابة بالآثار الجانبية الضارة مثل جلطات الدم (وخاصة خلال الأشهر الستة الأولى)، فضلاً عن الإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية وسطان الثدى.

آثار جانبية غير ضارة

من الطبيعي أن تتعرضين لآثار جانبية، بغض النظر عن وسيلة منع الحمل التي تستخدمينها. هذه الآثار غير ضارة. لحسن الحظ فإن معظم الآثار

الجانبية تختفي بعد مرور شهر لشهرين من الاستخدام، لذا يُرجى محاولة تحمل تلك الآثار عندما تبدأين استخدام وسيلة جديدة لمنع الحمل. الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي الصداع، الغثيان، تقلب المزاج، اضطرابات في أنماط نزيف الحيض، البثور وقلة الرغبة الجنسية.

ومن المهم بالنسبة لك أن تكوني راضية عن وسيلة منع الحمل التي تقررين استخدامها أيًا كان نوعها. فإذا لم تتوقف هذه الآثار الجانبية بعد فترة من الوقت، فإنه من المنطقي أن تتحولي إلى علامة تجارية أخرى أو لأي نوع آخر من وسائل منع الحمل. أنتِ الشخص الوحيد الذي يستطيع تقييم مدى سوء الآثار الجانبية المختلفة التي تتعرضين لها.

الاستخدام الصحيح هو الأكثر فعالية!

تعتبر معظم وسائل منع الحمل آمنة جدًا، ولكن لكي تعمل هذه الوسائل بشكل صحيح، يجب أن تستخدميها بعناية وعلى النحو الصحيح تمامًا، وخطر حدوث الحمل غير المتوقع يرتبط إلى حد كبير بمدى قدرتك على تذكر وسيلة منع الحمل الخاصة بك جيدًا، سواءً كان ذلك يتمثل في تناول أقراص منع الحمل يوميًا أو تغيير اللصقة أو الحلقة المهبلية المستعملة بأخرى جديدة في الوقت المحدد.

وتناول أدوية أخرى، مثل الأدوية المُضادة للصرع، قد يقلل من فعالية وسيلة منع الحمل الخاصة بك. وبالنسبة للسيدات اللاتي يتناولن أقراص منع الحمل، فإن هناك أمورًا أخرى قد تؤثر أيضًا على فعاليتها مثل القيء والإسهال.

وأسلم وسائل منع الحمل هي تلك التي يستحيل معها نسيان أي شيء أو القيام بأي شيء خطأ. وبالتالي يقل احتمال حدوث الحمل غير المتوقع لأدنى حد مع وسائل منع الحمل طويلة المفعول مثل الغرسات واللولب الرحمي.



نتطلب بعض وسائل منع الحمل أن تتذكريها أكثر من غيرها. كلما قلت الحاجة إلى تذكر الوسيلة، كلما قلت فرصة حدوث الأخطاء!

إحدى عميلات منظمة Sex og samfunn، السن 17 عامًا

آمنة جدًا



نوصى باستخدام وسائل منع الحمل الهرمونية للحماية من الحمل.

55

إذا كنتِ بصدد إقامة علاقة مع شريك جديد، فإننا ننصحك باستخدام الواقي الذكرى كذلك.

اللولب الرحمي النحاسي

وسائل منع الحمل غير الهرمونية

اللولب الرحمي النحاسي، ويُسمى أيضًا الحلزون، الواقي الرحمي النحاسي، هو أداة بلاستيكية على شكل حرف ٦، مع سلك نحاسي صغير جدًا يلتف حول الإطار البلاستيكي. تمنع اللوالب النحاسية حدوث الحمل دون استخدامر الهرمونات. يبلغ طول اللولب النحاسي حوالي 3 سمر تقريبًا. تظل دورة الإباضة مستمرة بشكل طبيعي، فقط يعمل النحاس الموجود في اللولب على قتل الحيوانات المنوية ومنعها من تخصيب البويضة، بمجرد تركيب اللولب، فلن تصبحي بحاجة لتذكره كي يعمل بشكل صحيح.

إذا استخدمتِ اللولب النحاسي، فإن نمط الحيض لديك سيظل كما هو دون تغيير. بعض السيدات تنزفن بصورة أكثر إلى حد ما، ولمدة أطول قليلاً، من الطبيعي من دون استخدام اللولب. واستخدام اللولب النحاسي لا يُضعف من قدرتك على إنجاب الأطفال، بغض النظر عن المدة التي تستخدمينه طيلتها.

المزايا

اللوالب النحاسية تعد واحدة من أضمن وسائل منع الحمل. ستوفر عليكِ اللوالب النحاسية الكثير من المتاعب. لن تضطري للتفكير في منع الحمل سوى مرة واحدة كل خمس سنوات. معظم النساء يمكنهن استخدام اللولب النحاسي - حتى أولئك اللاتي لمر يسبق لهن الإنجاب. لا تتسبب اللوالب النحاسية في أي من الآثار الجانبية الهرمونية، أو الآثار الجانبية الضارة على حد سواء.

العيوب

قد تجدين أن النزيف وتقلصات الحيض لديك أصبحت أشد وطأة إلى حد ما، وتستمر لفترة أطول من الطبيعي لديك. ربما لا يكون هذا الأمر مناسبًا لا سيما إذا كنت تعانين بالفعل من آلامر الحيض أو النزيف الحاد.

أين يمكنني الحصول على اللولب النحاسي؟

يمكن شراء اللوالب النحاسية من معظم الأطباء. كما يمكنك أيضًا شراؤها من الصيدلية. يتمر تركيب اللولب بواسطة الطبيب أو ممرضة الصحة العامة أو القابلة. بمجرد تركيب اللولب داخل الرحم، فلن تشعري به أنت ولا زوجك. يحتوي اللولب على سلك رقيق يتدلى لأسفل عبر عنق الرحم، ويمكنك أن تشعري به في الجزء الخلفي من المهبل إذا وضعت واحدًا أو اثنين من أصابعك فيه مباشرة.

ما هي الأمور التي يجب على التحقق منها قبل أن أقوم بتركيب اللولب النحاسي؟

- القائمة المرجعية لصحتك وسلامتك الشخصية (انظري صفحة 27)
 - · إجراء اختبار الحمل، فريما هناك احتمال أن تكوني حاملاً
 - اختبار للأمراض المنقولة جنسيًا قبل، أو في وقت، تركيب اللولب
- يجب عليكِ إجراء فحص للجهاز التناسلي عند تركيب اللولب النحاسي





- السعر: يُقدر بنحو 6-15 كرونة شهريًا*
- يتمر تركيبه بواسطة الطبيب/القابلة/ممرضة الصحة العامة كل 5 سنوات.

*السعر لدى Sex og samfunn هو 350 كرونة.

قد يتوفر لدى الصيدلى/الطبيب الخاص بك بسعر مختلف، قد يصل إلى حوالي 900 كرونة.

يتوفر مجانًا للفتيات من عمر 16 إلى 18 عامًا من العمر، وبنصف السعر للفتيات من عمر 19 عامًا.

- ننصحك بتناول أحد المسكنات قبل تركيب اللولب بساعة واحدة (2 قرص باراسيتامول (Paracetamol) 500 مجمر بالإضافة إلى 1 قرص آيبوبروفين (Ibuprofen) 400 مجمر).
- تشعر بعض السيدات بالرهبة من إدخال اللولب، فضلاً عن قلقهن مما إذا كان مؤذيًا لهن. فلتُفكري في الأمر باعتباره "استثمارًا لجهودك". لا تستغرق عملية تركيب اللولب وقتًا طويلاً، وبعد ذلك لن تكوني بحاجة للتفكير في منع الحمل طيلة السنوات الخمس القادمة!
 - حددي موعدًا مع الطبيب أو القابلة أو ممرضة الصحة العامة بعد مرور شهر إلى شهرين من تركيب اللولب للتأكد من كونه مُثبتًا في مكانه.
 - لا تستخدمي كأس الحيض مُطلقًا إذا قمت بتركيب لولب رحمي.
 - إذا أردت مواصلة استخدام اللولب بعد 5 سنوات، فيمكنك نزع اللولب القديم وتركيب آخر جديد.



الواقي الذكري

وسائل منع الحمل غير الهرمونية

تُصنع معظم الواقيات الذكرية من مادة اللاتكس، وهو نوع من المطاط. يتوفر الواقي الذكري في مقاسات وألوان وتكهات مختلفة. يتم وضع الواقي الذكري على القضيب المنتصب قبل الجماع ولا يتم نزعه إلا بعد الانتهاء من الجماع. يمكن لأي شخص استخدام الواقي الذكري. وتتوفر كذلك واقيات ذكرية خالية من المطاط، بحيث يُمكن للأشخاص الذين يعانون من حساسية من مادة اللاتكس استخدام الواقي الذكري.

الواقي الذكري هو وسيلة منع الحمل الوحيدة التي تحمى من الحمل والأمراض المنقولة جنسيًا أيضًا.

المزايا

يعتبر الواقي الذكري وسيلة أكيدة وفعالة للحماية من الحمل والأمراض المنقولة جنسيًّا، شريطة أن يتم استخدامه بشكل صحيح. يجعل الممارسة ممتعة. إذا اعتدت على استخدام الواقي الذكري في كل مرة، فإنه يصبح بشابة وسيلة فعالة جدًّا لمنع الحمل. الواقي الذكري لا يحتوي على أية هرمونات، لذا فإنه لا يتسبب في الآثار الجانبية التي تُصاحب الهرمونات. الواقي الذكري يمكن أن يُقلل بشكل طفيف من الإحساس في القضيب، ومن ثمر فإنه قد يكون وسيلة فعالة لإطالة فترة الجماع أكثر. مُعظم الواقيات الذكرية مُغطاة بمادة زلقة، مما يجعل الجماع أكثر راحة ومتعة.

العبوب

يعتبر البعض أن تقليل الواقي الذكري للإحساس عببًا وليس ميزة. كما أن اضطرارهمر إلى "إيقاف ما يقومون به" لوضع الواقي الذكري قبل الجماع قد يكون أمرًا مزعجًا كذلك.

أين يمكنني الحصول على الواقي الذكري؟

يمكنك طلب الواقي الذكري مجانًا عن طريق البريد، وسيتم إرساله في عبوة سرية، من الموقع <u>www.gratiskondomer.no. وشياع الواقيات الذكري</u>ة في معظم محلات البقالة والسوير ماركت والأكشاك. الحصول على الواقيات الذكرية مجانًا من Sex og samfunn. وتُباع الواقيات الذكرية في معظم محلات البقالة والسوير ماركت والأكشاك. وتوجد أيضًا ماكينات البيع في بعض المراحيض العامة والنوادي، الخ

ما هي الأمور التي يجب التحقق منها؟

لا توجد أية فحوصات ضرورية لاستخدام الواقي الذكري. لا تتردد في تجربة مختلف المقاسات والروائح والنكهات والتصميمات.







- السعر: مجانًا على الموقع .www.gratiskondomer.no؛ وخلاف ذلك يبلغ سعره حوالي 60-100 كرونة للعبوة 10 قطع.
 - يجب وضعه على القضيب قبل الجماع.

- افحص التاريخ المطبوع على العبوة وتأكد من سلامة الواقى وعدم تمزقه.
 - افتح العبوة بحذر كي لا تتسب في تلف الواقي الذكري.
 - لا تضع الواقي الذكري على القضيب إلا بعد انتصابه.
- اسحب القلفة إلى الخلف عندما تضع الواقي الذكري، ما لمر تكن قد خضعت للخِتان.
- اضغط على حلمة الواقي الذكري لإزالة الهواء (فقد تتسبب فقاعات الهواء في تمزق الواقي الذكري).
- أمسك بحلمة الواق الذكري بما يُساوي عرض إصبع على الأقل، بينما تقوم بلف الجزء المتبقي من الواق الذكري على القضيب، واحرص على عدم إتلاف الواق الذكري بأظافرك. قم بلف الواق لأسفل وصولاً إلى قاعدة القضيب.
- أمسك الواقي الذكري عند قاعدة القضيب عندما تقوم بسحب قضيبك من المهبل. يجب استخدام الواقي الذكرى طوال فترة الجماع.
 - يجب استخدام الواقي الذكرى مرة واحدة فقط.
 - تخلص من الواقي الذكري في سلة القمامة المنزلية بعد الاستعمال، وليس في المرحاض.
 - اجعل من "تلبيس" القضيب أمرًا باعثًا إلى المرح والمتعة!



اللولب الرحمى الهرموني

وسائل منع الحمل الهرمونية المحتوية على البروجيسترون فقط

اللولب الرحمي الهرموني، أو الحلزون، هو أداة مصنوعة من البلاستيك اللدن ويبلغ طولها حوالي 3 سم. ويعتبر اللولب الهرموني فعالاً لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، ولكن يمكن إزالته قبل ذلك، مثلاً إذا كنت ترغين في الحمل. بمجرد تركيب اللولب، فلن تصبحي بحاجة لتذكره كي يعمل بشكل صحيح. ينقطع الحيض لدى معظم السيدات اللاتي يستخدمن اللولب الهرموني بعد حين. وبعضهن يحتفظن بنمط الحيض الطبيعي، بينما البعض الآخر قد يعانين من نزيف غير منتظم أو التبقيع (نزول قطرات من الدم). وعلى الرغمر من أن ذلك قد يبدو مزعجًا، إلا أنه ليس مؤذيًا.

عند التوقف عن استخدام اللولب الهرموني، فسوف تستعيدين نمط الحيض الطبيعي لديك بسرعة. واستخدام اللولب الهرموني لا يُضعف من قدرتك على إنجاب الأطفال، بغض النظر عن المدة التي تستخدمينه طيلتها.

هناك ثلاث علامات تجارية مختلفة:

- مايرينا (Mirena): تستمر فعاليته لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- جايديس (Jaydess): تستمر فعاليته لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
- ليفوسيرت (Levosert): وهو نوع جديد في السوق وهو معتمد حاليًا للاستخدام لمدة ثلاث سنوات فقط.
 ومن المُرجح زيادة فترة استخدامه المعتمد إلى خمس سنوات.

المزايا

ستوفر عليك اللوالب الهرمونية الكثير من المتاعب. لن تضطري للتفكير في منع الحمل سوى مرة واحدة كل خمس (أو ثلاث) سنوات. معظم النساء يمكنهن استخدام اللولب الهرموني - حتى أولئك اللاتي لمر يسبق لهن الإنجاب. فهذه الوسيلة ليست لها أية آثار جانبية ضارة.

العبوب

لا يمكنك التنبؤ بما سيبدو عليه نمط الحيض لديك بعد ذلك.

أين يمكنني الحصول على اللولب الهرموني

يمكن شراء اللولب الهرموني من الصيدليات. يُمكن وصف وتركيب اللولب بواسطة الطبيب أو ممرضة الصحة العامة أو القابلة. بمجرد تركيب اللولب داخل الرحم ، فلن تشعري به أنت ولا زوجك. يحتوي اللولب الهرموني على سلكين رقيقين يتدليان لأسفل عبر عنق الرحم ، ويمكنك أن تشعري بهما في الجزء الخلفي من المهبل إذا وضعت اثنين من أصابعك فيه مباشرة.

ما هي الأمور التي يجب عليّ التحقق منها قبل أن أقوم بتركيب اللولب الهرموني؟

- القائمة المرجعية لصحتك وسلامتك الشخصية أنت وعائلتك (انظري صفحة 27)
 - · إجراء اختبار الحمل، فريما هناك احتمال أن تكوني حاملاً
 - اختبار للأمراض المنقولة جنسيًا قبل، أو في وقت، تركيب اللولب
 - يجب عليك إجراء فحص للجهاز التناسلي عند تركيب اللولب



يتمر تركيبه بواسطة الطبيب/القابلة/ممرضة الصحة العامة كل 3 أو 5سنوات.

*سعر اللولب الهرموني 255-1225 كرونة، ويمكن استخدامه لمدة 3-5 سنوات. يتوفر اللولب الهرموني مجانًا للفتيات من عمر 16 إلى 17 عامًا. إذا كان عمرك 18 عامًا، فسيتعين عليكِ دفع حوالي قُلث الثمن، والفتيات من عمر 19 عامًا يدفعن حوالي ثُلثي الثمن.

- ننصحك بتناول أحد المسكنات قبل تركيب اللولب بساعة واحدة (2 قرص باراسيتامول (Paracetamol)
 500 مجم بالإضافة إلى 1 قرص آيبوبروفين (Ibuprofen)
- تشعر بعض السيدات بالرهبة من إدخال اللولب، فضلاً عن قلقهن مما إذا كان مؤذيًا لهن، فلتُفكري في الأمر باعتباره "استثمارًا لجهودك". لا تستغرق عملية تركيب اللولب وقتًا طويلاً، وبعد ذلك لن تكوني بحاجة للتفكير في منع الحمل طيلة السنوات الخمس (أو الثلاث) القادمة!
- حددي موعدًا مع الطبيب أو القابلة أو الممرضة بعد مرور شهر إلى شهرين من تركيب اللولب للتأكد من كونه مُئيتًا في مكانه.
 - لا تستخدمي كأس الحيض مُطلقًا إذا قمت بتركيب لولب هرموني.
 - · إذا أردت مواصلة استخدام اللولب بعد 5 (أو 3) سنوات، فيمكنك نزع اللولب القديم وتركيب آخر جديد.



غرسات منع الحمل

وسائل منع الحمل الهرمونية المحتوية على البروجيسترون فقط

غرسات منع الحمل أو غرسات تنظيم النسل، هي عود بلاستيكي صغير، يبلغ طوله 4 سمر وقُطره 2 ممر. تحتوي غرسات منع الحمل على هرمون البروجيسترون فقط.

تستمر فعالية الغرسة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ومع ذلك، يُمكن إزالتها أيضًا قبل مرور تلك المدة، بمجرد تركيب الغرسة، فلن تصبحي بحاجة لتذكرها كي تعمل بشكل صحيح، مُعظم السيدات اللاتي يستخدمن غرسة منع الحمل إما أن ينقطع الحيض لديهن تمامًا، أو يظل الحيض على نفس نمطه الطبيعي، وبعض السيدات قد يعانين من نزيف غير منتظم أو التبقيع (نزول قطرات من الدم). وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو مزعجًا، إلا أنه ليس مؤذيًا.

وبمجرد إزالة الغرسة، سرعان ما تحدث عملية الإباضة مرة أخرى. لا تؤثر الغرسة على خصوبتك، مهما طالت فترة استخدامك لها.

المزايا

ستُوفر عليكِ غرسات منع الحمل الكثير من المتاعب. لن تضطري للتفكير في منع الحمل سوى مرة واحدة كل ثلاث سنوات. معظم السيدات يُمكنهن استخدام الغرسات. فهذه الوسيلة ليست لها أية آثار جانبية ضارة.

العيوب

لا يمكنك التنبؤ بما سيبدو عليه نمط الحيض لديك بعد ذلك.

أين يمكنني الحصول على غرسة منع الحمل؟

يمكن شراء غرسات منع الحمل من الصيدليات. يُمكن وصف وتركيب الغرسة بواسطة الطبيب أو ممرضة الصحة العامة أو القابلة. يتم تركيب الغرسة تحت الجلد مباشرة في الجزء العلوي من الذراع، وهذا يعني أن بإمكانك الشعور بها وليس رؤيتها. ستتكون لديكِ ندبة صغيرة طولها حوال 3 مم في موضع تركيب الغرسة. ستحصلين على مخدر موضعي قبل تركيب الغرسة، وبالتالي فإن هذا الإجراء ليس ضارًا على الإطلاق.

ما هي الأمور التي يجب عليّ التحقق منها قبل أن أقوم بتركيب غرسة منع الحمل؟

- القائمة المرجعية لصحتك وسلامتك الشخصية أنت وعائلتك (انظرى صفحة 27)
 - إجراء اختبار الحمل، فريما هناك احتمال أن تكوني حاملاً
 - لا توجد ضرورة لإجراء فحص للجهاز التناسلي



- السعر يُقدر بحوالي 32 كرونة شهريًا*
- يتمر تركيبها بواسطة الطبيب/ممرضة الصحة العامة/القابلة كل 3 سنوات

*يبلغ سعر غرسة منع الحمل 1141 كرونة. وتستمر فعاليتها لمدة تصل إلى 3 سنوات. تتوفر غرسات منع الحمل مجانًا للفتيات من عمر 16 إلى 17 عامًا. إذا كان عمرك 18 عامًا، فسيتعين عليكِ دفع حوالي ثُلث الثمن، والفتيات من عمر 19 عامًا يدفعن حوالي ثُلثيّ الثمن.

- لا يُسبب تركيب الغرسة أي ضرر على الإطلاق فسيتمر منحك مُخدرًا موضعيًا قبل ذلك.
- بعد تركيب الغرسة، ستتكون لديكِ ندبة صغيرة طولها حوالي 3 ممر في موضع تركيب الغرسة.
- إذا أردت مواصلة استخدام الغرسة بعد 3 سنوات، فيمكنك نزع الغرسة القديمة وتركيب أخرى جديدة.



حقن منع الحمل

وسائل منع الحمل الهرمونية المحتوية على البروجيسترون فقط

تحتوي حقن منع الحمل أو حقن تنظيم النسل على هرمون البروجيسترون فقط. لكي تكون حقن منع الحمل فعّالة، من المهم بالنسبة لك أن تحصلين على الحقنة الجديدة بعد فترة لا تتجاوز 12 أسبوعًا من سابقتها. ينقطع الحيض لدى معظم السيدات اللاتي يستخدمن حقن منع الحمل بعد حين، والبعض قد يعانين من نزيف غير منتظم أو التبقيع (نزول قطرات من الدمر). وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو مزعجًا، إلا أنه ليس مؤذيًا.

بمجرد التوقف عن تعاطي حقن منع الحمل، غالبًا ما يمر وقت طويل قبل أن تعود دورة الإباضة إلى طبيعتها مرة أخرى، لذلك قد تجدين أنك استعدت نمط الحيض الطبيعي لديك بعد مرور 6-12 شهرًا. ورغمر ذلك، فإن حقن منع الحمل لا تؤثر بتاتًا على الخصوبة بعد تلك الفترة، بغض النظر عن طول المدة التي كنت تتعاطين خلالها هذه الحقن.

المزايا

ستوفر عليك حقن منع الحمل الكثير من المتاعب. لن تضطري للتفكير في منع الحمل سوى أربع مرات في العام. معظم السيدات يُمكنهن استخدام حقن منع الحمل. حقن منع الحمل ليست لها أية آثار جانبية ضارة.

العيوب

قد تكون هناك ثمة علاقة تربط بين استخدام حقن منع الحمل مع الفتيات اللاق لمر يبلغن بشكل كامل وهشاشة العظامر التي تصيبهن في سنوات لاحقة، والبعض أيضًا يجدن أن أحد مساوئها تلك الفترة الطويلة التي قد تمر قبل استعادتهن لنمط الطمث والإباضة الطبيعي بعد التوقف عن تعاطى حقن منع الحمل.

أين يمكنني الحصول على حقن منع الحمل؟

يمكنك شراء حقن منع الحمل من الصيدليات. يُمكن وصف وإعطاء الحقنة بواسطة الطبيب أو ممرضة الصحة العامة أو القابلة.

ما هي الأمور التي يجب عليّ التحقق منها قبل تعاطي الحقنة؟

- · القائمة المرجعية لصحتك وسلامتك الشخصية أنت وعائلتك (انظرى صفحة 27)
 - إجراء اختبار الحمل، فريما هناك احتمال أن تكوني حاملاً
 - لا توجد ضرورة لإجراء فحص للجهاز التناسلي.





- السعر يُقدر بحوالي 29 كرونة شهريًا*
- يتم حقنها بواسطة الطبيب/الممرضة/القابلة كل 12 أسبوعًا

*يبلغ سعر حقنة منع الحمل "ديبو بروفيرا" (Depo-Provera) 86 كرونة للحقنة الواحدة، وتستمر فعاليتها لمدة 12 أسبوعًا. إذا كان عمرك يتراوح بين 16 إلى 20 عامًا، فلن تُكلفك حقن منع الحمل شيئًا.

إرشادات مفيدة:

إذا تعرضت إلى نزيف غزير وغير منتظم أو تبقيع (نزول قطرات من الدم)، فيستحسن بالنسبة لكِ أن تحصلي على حقنة جديدة بعد 8 أسابيع. بالنسبة لمعظم السيدات، سوف يتوقف النزيف لاحقًا.



أقراص البروجيسترون

وسائل منع الحمل الهرمونية المحتوية على البروجيسترون فقط

تحتوي أقراص البروجيسترون على هرمون البروجستيرون فقط. لكي تكون أقراص البروجيسترون فعّالة، من المهم بالنسبة لك أن تتناوليها في نفس الوقت كل يوم، ودون أي انقطاع بين عبوات الأقراص. ينقطع الحيض لدى العديد من السيدات اللاتي يستخدمن أقراص البروجيسترون بعد حين. وبعضهن يحتفظن بنمط الحيض الطبيعي، بينما البعض الآخر قد يعانين من نزيف غير منتظم أو التبقيع (نزول قطرات من الدم). وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو مزعجًا، إلا أنه ليس مؤذيًا.

وبمجرد التوقف عن تناول أقراص البروجيسترون، سرعان ما تحدث عملية الإباضة مرة أخرى. لا تؤثر أقراص البروجيسترون على خصوبتك، مهما طالت فترة استخدامك لها.

المزايا

معظم السيدات يُمكنهن استخدام أقراص البروجستيرون. فهذه الأقراص ليست لها أية آثار جانبية ضارة.

العيوب

يجب أن تتذكري تناول القرص كل يوم. أيضا، لا يمكنك التنبؤ بما سيبدو عليه نمط الحيض لديك بعد ذلك.

أين يمكنني الحصول على أقراص البروجيسترون؟

يُمكن وصف هذه الأقراص بواسطة الطبيب أو ممرضة الصحة العامة أو القابلة. تتوفر أقراص البروجيسترون في الصيدليات فقط.

ما هي الأمور التي يجب على التحقق منها قبل أن أتناول أقراص البروجيسترون؟

- القائمة المرجعية لصحتك وسلامتك الشخصية أنت وعائلتك (انظري صفحة 27)
 - إجراء اختبار الحمل، فريما هناك احتمال أن تكونى حاملاً
 - لا توجد ضرورة لإجراء فحص للجهاز التناسلي.





- تُقدر التكلفة بنحو 29-60 كرونة شهريًا*
 - يجب تناولها يوميًا دون انقطاع

*سعر العبوة الواحدة المحتوية على 3 شرائط (تكفي للاستخدام 3 أشهر) يتراوح بين 18-181 كرونة. إذا كان عمرك يتراوح بين 16 و20 عامًا، فستحصلين على خصم 111 كرونة كل ثلاثة أشهر، مما يعنى أنه يمكنك الحصول على بعض أقراص البروجيسترون مجانًا.

- تناولي القرص في الصباح وبالتالي فإن ذلك يمنحك 12 ساعة كاملة لتتذكريه في حال نسيت تناول أحد الأقراص (باستثناء كونلوداج (Conludag)، حيث يتعين عليك أن تتذكريه خلال 3 ساعات).
 - يمكنك الاستعانة بهاتفك المحمول لتتذكري موعد تناول الأقراص، عن طريق ضبط المنبه أو تنزيل أحد التطبيقات التي توفر لك تذكِرة يومية لتناول الأقراص.



حلقات منع الحمل المهبلية

وسائل منع الحمل الهرمونية المحتوية على الإستروجين والبروجستيرون

تحتوي الحلقات المهبلية على اثنين من الهرمونات، هما الإستروجين والبروجستيرون. الحلقات المهبلية عبارة عن حلقة لدنة من المطاط. يمكنكِ الضغط على الحلقة بين السبابة والإبهام وإدخالها في مهبلك. طالما تم إدخال الحلقة المهبلية بشكل صحيح، فإنك لن تلاحظيها أبدًا، ولن تشعرى بها أثناء الجماع أيضًا.

وبمجرد التوقف عن استخدام الحلقة المهبلية، سرعان ما تحدث عملية الإباضة مرة أخرى. لا تؤثر الحلقات المهبلية على خصوبتك، مهما طالت فترة استخدامك لها.

المزايا

تتمثل ميزة الحلقات المهبلية في كونها تتبح لكِ التحكم بشكل جيد في نمط الحيض لديك. يمكنك اختيار تجاوز دورات الحيض. إذا واصلت استخدام الحلقات بدون أي انقطاع بينها، فسيحدث الحيض لديكِ في نهاية المطاف. بعد ذلك خذي فترة راحة لمدة 7-4 أيام، ثمر أدخلي الحلقة التالية.

العيوب

يجب أن تتذكري تغيير الحلقات بشكل منتظم. إذا كنت تعانين من مرض القُلاع أو التهاب المهبل البكتيري، فسيكون من الصعب علاجك منه بينما تستخدمين الحلقة المهبلية.

من اللاتي يُمكنهن استخدام حلقات منع الحمل المهبلية؟

معظم السيدات يُمكنهن استخدام الحلقات المهبلية. ونظرًا لأن هناك خطر طفيف من حدوث آثار جانبية ضارة، تُنصح بعض السيدات بعدم استخدام الحلقات المهبلية أو وسائل منع الحمل الأخرى المحتوية على الإستروجين.

أين يمكنني الحصول على حلقات منع الحمل المهبلية؟

يُمكن وصف هذه الحلقات بواسطة الطبيب أو ممرضة الصحة العامة أو القابلة. تتوفر حلقات منع الحمل المهبلية في الصيدليات فقط.

ما هي الأمور التي يجب على التحقق منها قبل استخدام الحلقات المهبلية؟

- القائمة المرجعية لصحتك وسلامتك الشخصية أنت وعائلتك (انظري صفحة 27)
 - قياس ضغط الد
 - إجراء اختبار الحمل، فريما هناك احتمال أن تكونى حاملاً
 - لا توجد ضرورة لإجراء فحص للجهاز التناسلي.



- السعر يُقدر بحوالي 113 كرونة شهريًا*
 - يجب تغييرها كل 3 أسابيع

*يبلغ سعر الحلقة المهبلية الواحدة حوالي 113 كرونة وتستمر فعاليتها لمدة ثلاثة أسابيع. إذا كنت ممن تتراوح أعمارهن بين 16-20 عامًا، فإن الحكومة ستتكفل بدفع 111 كرونة من إجمالي التكلفة كل ثلاثة أشهر.

- يمكنك بسهولة إدخال الحلقة وإزالتها بنفسك عن طريق الضغط عليها لجعلها أصغر في الحجم وإدخالها في مهبلك أو إخراجها منه.
 - لا يشكل وجود الحلقة في المهبل عائقًا أثناء الجماع.
 - يُمكن إزالة الحلقة لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات يوميًا، ثمر إعادة إدخالها. وستظل محتفظة بفعاليتها في حمايتك من الحمل.



لصقات منع الحمل

وسائل منع الحمل الهرمونية المحتوية على الإستروجين والبروجستيرون

لصقات منع الحمل أو لصقات تنظيم النسل هي لصقات جلدية يبلغ حجمها 4.5 × 4.5 سم وتحتوي على اثنين من الهرمونات، هما الإستروجين والبروجستيرون. لكي تكون لصقة منع الحمل فعّالة، من المهم بالنسبة لك أن تقومي باستبدالها كل أسبوع.

وبمجرد التوقف عن استخدام لصقات منع الحمل، سرعان ما تحدث عملية الإباضة مرة أخرى. لا تؤثر لصقات منع الحمل على خصوبتك، مهما طالت فترة استخدامك لها.

المزايا

تتمثل ميزة اللصقات في كونها تتيح لك التحكم بشكل جيد في نمط الحيض لديك. يمكنك اختيار تجاوز دورات الحيض عن طريق تجاوز أسابيع الراحة التي لا يتم استخدام اللصقة خلالها. إذا واصلت تجاوز أسابيع الراحة تلك، فسيحدث الحيض لديكِ في نهاية المطاف. وعندما يحدث الحيض، يمكنك بعد ذلك أخذ فترة راحة لمدة 7-4 أيام قبل بدء دورة اللصقات الثلاث التالية.

العيوب

يجب أن تتذكري وضع لصقة جديدة كل أسبوع.

من اللاق يُمكنهن استخدام لصقات منع الحمل؟

معظم السيدات يُمكنهن استخدام لصقات منع الحمل. ونظرًا لأن هناك خطر طفيف من حدوث آثار جانبية ضارة، تُنصح بعض السيدات بعدم استخدام اللصقات أو وسائل منع الحمل الأخرى المحتوية على الإستروجين.

أين يمكنني الحصول على لصقات منع الحمل؟

يُمكن وصف هذه الأقراص بواسطة الطبيب أو ممرضة الصحة العامة أو القابلة. تتوفر لصقات منع الحمل في الصيدليات فقط.

ما هي الأمور التي يجب عليّ التحقق منها قبل استخدام لصقات منع الحمل؟

- القائمة المرجعية لصحتك وسلامتك الشخصية أنت وعائلتك (انظري صفحة 27)
 - قياس ضغط الدمر
 - إجراء اختبار الحمل، فريما هناك احتمال أن تكوني حاملاً
 - لا توجد ضرورة لإجراء فحص للجهاز التناسلي.



- السعر يُقدر بحوالي 29 كرونة شهريًا*
 - يجب تغييرها كل أسبوع

*سعر العبوة الواحدة، بها 9 لصقات (تكفي للاستخدام 3 أشهر) يبلغ 276 كرونة. إذا كان عمرك يتراوح بين 16 و20 عامًا، فستحصلين على خصمر 111 كرونة كل ثلاثة أشهر.

- تتسم هذه اللصقات بكونها مُقاومة للماء ولا تفقد مفعولها بعد السباحة، أو الاستحمام أو التعرق.
- يمكن وضع اللصقة في أي منطقة من الجلد، على أن تكون سليمة ونظيفة وجافة باستثناء ثدييك، حيث لا يجوز وضعها مُطلقًا عليهما. والمكان الأكثر شيوعًا لوضع اللصقة هو الجزء العلوي من الذراع.
 - يمكنك، إذا أردت، أن تُغيّري المنطقة عندما تضعين لصقة جديدة، لتجنب أي تهيج للجلد.



أقراص منع الحمل

وسائل منع الحمل الهرمونية المحتوية على الإستروجين والبروجستيرون

تحتوي أقراص منع الحمل على اثنين من الهرمونات، هما الإستروجين والبروجستيرون. لكي تكون أقراص منع الحمل فعّالة، من المهم بالنسبة لك أن تتناوليها في نفس الوقت كل يوم. وبمجرد التوقف عن تناول أقراص منع الحمل، سرعان ما تحدث عملية الإباضة مرة أخرى. لا تؤثر أقراص منع الحمل على خصوبتك، مهما طالت فترة استخدامك لها.

المزايا

تتمثل ميزة أقراص منع الحمل في كونها تتيح لكِ التحكم بشكل جيد في نمط الحيض لديك. يمكنك اختيار تجاوز دورات الحيض عن طريق تناول العبوة الجديدة من الأقراص وتجاوز فترة الراحة بين العبوات، أو بتجاوز الأقراص عديمة الفعالية "أو ما يُعرف بالأقراص الوهمية". إذا واصلت تجاوز فترة الراحة تلك، فسيحدث الحيض لديكِ في نهاية المطاف على أية حال. وعندما يحدث الحيض، يمكنك بعد ذلك أخذ فترة راحة لمدة 7-4 أيام قبل بدء تناول العبوة الجديدة.

العبوب

يجب أن تتذكري تناول القرص كل يوم.

من اللاتي يُمكنهن استخدام أقراص منع الحمل؟

معظم السيدات يُمكنهن استخدام أقراص منع الحمل. ونظرًا لأن هناك خطر طفيف من حدوث آثار جانبية ضارة، تُنصح بعض السيدات بعدم استخدام أقراص منع الحمل أو وسائل منع الحمل الأخرى المحتوية على الإستروجين. يُوصي مركز RELIS (مركز معلومات الأدوية المستقل) باستخدام ميكروجينون (Microgynon) أو أوركالون (Oralcon) (علبة 21 قرصًا) و لويت (Loette) (علبة 28 قرصًا) كأول خيار في وسائل منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم.

أين يمكنني الحصول على أقراص منع الحمل؟

يُمكن وصف هذه الأقراص بواسطة الطبيب أو ممرضة الصحة العامة أو القابلة. تتوفر أقراص منع الحمل في الصيدليات فقط.

ما هي الأمور التي يجب عليّ التحقق منها قبل استخدام أقراص منع الحمل؟

- القائمة المرجعية لصحتك وسلامتك الشخصية أنت وعائلتك (انظري صفحة 27)
 - قياس ضغط الدمر
 - إجراء اختبار الحمل، فريما هناك احتمال أن تكوني حاملاً
 - لا توجد ضرورة لإجراء فحص للجهاز التناسلي.





- السعر يُقدر بنحو 25-118 كرونة شهريًا*
- يجب تناولها يوميًا، وفترة الراحة أمر اختياري

*الأسعار مختلفة. فأرخص نوع من أقراص منع الحمل يكلف 75 كرونة، وأغلى الأنواع يكلف 354 كرونة، للعبوة الواحدة. تحتوي كل عبوة على 3 شرائط من أقراص منع الحمل (تكفي للاستخدام 3 أشهر). إذا كان عمرك يتراوح بين 16 و20 عامًا، فستحصلين على خصم 111 كرونة كل ثلاثة أشهر، مما يعني أنه يمكنك الحصول على بعض أقراص منع الحمل مجانًا.

- تناولي القرص في الصباح وبالتالي فإن ذلك يمنحك 12 ساعة كاملة لتتذكريه في حال نسيت تناول أحد الأقراص.
 - يمكنك الاستعانة بهاتفك المحمول لتتذكري موعد تناول الأقراص، عن طريق ضبط المنبه أو تنزيل أحد التطبيقات التي توفر لك تذكرة يومية لتناول الأقراص.



هل نسيت استخدام إحدى وسائل منع الحمل؟

إذا كنت قد نسيت تناول أقراص منع الحمل، أو تغيير الحلقة المهبلية أو اللصقة، وكنت مترددة بشأن ما يجب القيام به، يمكنك زيارة الموقع www.sexogsamfunn.no حيث تتوفر لدينا خدمة الدردشة.

هناك ثلاثة خيارات مختلفة من وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ لمنع حدوث الحمل بعد ممارسة الجنس دون وقاية. اثنتان من هذه الوسائل يمكنهما منع عملية الإباضة.

رغم أن بعض وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ تظل فعالة لنحو 5 أيام بعد ممارسة الجنس دون وقاية، إلا أننا نوصي باستخدامها في أسرع وقت ممكن. فكلما استخدمتيها بشكل أسرع، كلما كانت فعاليتها أكبر. يجب عليك أيضًا إجراء اختبار الحمل بعد مرور 3 أسابيع من ممارسة الجنس دون وقاية لاستبعاد الحمل.

وسائل منع الحمل الهرمونية الطارئة

النوع: إيلاوان (EllaOne) يظل فعالاً لمدة تصل إلى خمسة أيام (120 ساعة) بعد ممارسة الجنس دون وقاية

يمنع الحمل في حوالي 4/3 الحالات إذا ما تمر تناوله في يمكن شراؤه من الصيدلية - لن تحتاجي إلى وصفة طبية. غضون 12 ساعة. بعد ذلك بصبح أقل فعالبة.

النوع: نورليفو (Norlevo) يظل فعالاً لمدة تصل إلى ثلاثة أيام (72 ساعة) بعد ممارسة الجنس دون وقابة

يمنع الحمل في حوالي 3/2 الحالات إذا ما تمر تناوله في يمكن شراؤه من الصيدلية - لن تحتاجي إلى وصفة طبية. غضون 12 ساعة. بعد ذلك يصبح أقل فعالية.

تحتوي هذه الأقراص على هرمون البروجيسترون. وهي تعمل عن طريق تأجيل عملية الإباضة لبضعة أيام. تناولي القرص في أسرع وفت ممكن بعد ممارسة الجنس دون وقاية. إذا تقيأت بعد تناوله خلال أقل من 3 ساعات، فيجب عليكِ تناول قرصًا آخر.

اللولب الرحمي النحاسي كأحد وسائل منع الحمل الطارثة

النوع: اللولب الرحمي النحاسي يظل فعالاً لمدة تصل إلى خمسة أيام (120 ساعة) بعد ممارسة الجنس دون وقاية

يمنع الحمل بين أكثر من 99 في المائة من النساء إذا تم يجب عليكِ الاتصال بالطبيب/القابلة/ممرضة الصحة العامة تركيبه في غضون 5 أيام.

لا يوقف اللولب الرحمي عملية الإياضة، ولكنه يمنح أي بيضة يُحتمل أن تكون مُخصبة من الالتصاق ببطانة الرحم، وبالتالي يمنع الحمل. اقرأي المزيد حول اللولب الرحمي النحاسي في الصفحة 8.

أود أن يخبرني الطبيب/ممرضة الصحة العامة/القابلة بالمزيد حول وسائل منع الحمل التالية (يُرجى وضع علامة): اللولب الرحمي الواق الذكري اللولب الرحمي غرسات منع الحمل حقن منع الحمل التحاسي العوسوني اللولب الرحمي العوسوني العوسوني النصام السروجيسترون الحلقات المهيلية لصقات منع الحمل التي تريدينها، من المهم بالنسبة لك أن تستكملي النقاط التالية قبل موعدك: قد أكون حاملاً بالفعل الآن (مارست الجنس دون وقاية/نسبت تناول القرص) لا نعم غير متأكد الدي نويف مهبلي غير منظم (بزيف بين دورات الحيض) الني نويف مهبلي غير منظم (بزيف بين دورات الحيض) الني نويف مهبلي غير منظم (بزيف بين دورات الحيض) الني نويف مهبلي غير منظم الدم (أو أتحد اضطرابات التختر المعروفة السيت بستخة دماغية أو نوية قلبية. المستوق أن أصبت بسيطونان التدي المستوق المناق الصفراوية حاليًا ومن قبل المستوق أن أصبت بسيطونان التدي المعروفة حاليا من مرض المي الكبد أو القناة الصفراوية حاليًا ومن قبل المكري المستوق أن أصبت بسيطونان التدي إلى من مناقب أراق وحدمل أن أكون مصابة) بعدوى في الجهاز التناسلي (مثل الكلاميديا) إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو الدواء (يرجى كتابة سبب تناوله إذا كنت لا تستطيعين تذكر الاسم): التأويخ: وسبلة منع الحمل المُختارة: وستكمل بواسطة الطبيب/معرضة الصحة العامة/القابلة النوسية الحمل المُختارة: وسبلة منع الحمل المُختارة: وسبلة المناسبة الطبيب/معرضة الحمد المُختارة: وسبلة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة العامة العامة العامة المناسبة	يرجى إحضار هذا النموذج في موعدك.	رقم الضمان الاجتماعي: (11 رقمًا):	قِمًا):			
التحاسي الهرموني الحلقات المهبلية المتعال المهبلية المتعال ال	أود أن يخبرني الطبيب/ممرضة الصحة العامة/القابلة بالمزيد حول وسائل منع الحمل التالية (يُرجى وضع علامة):					
الطارية لكن يتسنى لنا ضمان سلامتك عند وصف وسيلة منع الحمل التي تريدينها، من المهم بالنسبة لك أن تستكملي النقاط التالية قبل موعدك: قد أكون حاملاً بالفعل الآن (مارست الجنس دون وقاية/نسيت تناول القرص) إذا تُدخنة (أدخن بانتظام و/أو في المناسبات) لا نعم غير متنظم (نزيف مين دورات الحيض) إذا منابة، أو سبق وأن أصبت، بجلطات الدم أو أحد اضطرابات التختر المعروفة صبق وأن أصبت بسكتة دماغية أو نوية قلبية. أعاني من مرض ما في الكبد أو القناة الصفاوية حاليًا ومن قبل مبق وأن أصبت بسرطان الثدي عبيق وأن أصبت بسرطان الثدي المائين من مرض المن التكوي المنا مصابة (أو يحتمل أن أكون مصابة) بعدوى في الجهاز التناسلي (مثل الكلاميديا) إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو الدواء (يرجى كتابة سبب تناوله إذا كنت لا تستطيعين تذكر الاسمر): لتُستكمل بواسطة الطبيب/ممرضة الصحة العامة/القابلة: وسيلة منع الحمل المُختارة:			حمل 🔲 حف	ن منع الحمل		
قبل موعدك: قبل موعدك: قد أكون حاملاً بالفعل الآن (مارست الجنس دون وقاية/نسيت تناول القرص) أنا مُدخنة (أدخن بانتظام و/أو في المناسبات) لا ينيف مهيلي غير منتظم (نزيف بين دورات الحيض) أنا مصابة، أو سبق وأن أصبت، بجلطات الدم أو أحد اضطرابات التخثر المعروفة صبية وأن أصبت بسكتة دماغية أو نوية قلبية. أعاني من ارتفاع في ضغط الدم (أو أتناول أدوية ضغط الدم) أعاني من رض ما في الكبد أو القناول أدوية ضغط الدم) سبق وأن أصبت بسرطان الثدي سبق وأن أصبت بسرطان الثدي أعاني من الصداع النصفي أعاني من الصداع النصفي أعاني من الصداع النصفي أنا مصابة (أو يحتمل أن أكون مصابة) بعدوى في الجهاز التناسلي (مثل الكلاميديا) إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو الدواء (يرجى كتابة سبب تناوله إذا كنت لا تستطيعين تذكر الاسم): لشتكمل بواسطة الطيب/ممرضة الصحة العامة/انقابلة: وسيلة منع الحمل المُختارة: وسيلة منع الحمل المُختارة:	ا أقراص البروجيسترون الحلقات المهبلية					
قد أكون حاملاً بالفعل الآن (مارست الجنس دون وقاية/نسيت تناول القرص) أنا مُدخنة (أدخن بانتظام و/أو في المناسبات) لديّ نزيف مهبلي غير منتظم (نزيف بين دورات الحيض) أنا مصابة، أو سبق وأن أصبت، بجلطات الدم أو أحد اضطرابات التخثر المعروفة صبق وأن أصبت بسكتة دماغية أو نوبة قلبية. أعاني من ارتفاع في ضغط الدم (أو أتناول أدوية ضغط الدم) أعاني من مرض ما في الكبد أو القناة الصفراوية حاليًا ومن قبل أعاني من مرض السكري أعاني من الصداع النصفي أعاني من الصداع النصفي أعاني من الصداع النصفي أنا مصابة (أو يحتمل أن أكون مصابة) بعدوى في الجهاز التناسلي (مثل الكلاميديا) أنا أمابة (أو يحتمل أن أكون مصابة) بعدوى في الجهاز التناسلي (مثل الكلاميديا) إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو الدواء (يرجى كتابة سبب تناوله إذا كنت لا نستطيعين تذكر الاسم): مستكمل بواسطة الطبيب/ممرضة الصحة العامة/القابلة: وسيلة منع الحمل المُختارة:		ع الحمل التي تريدينها، من المهم بالنسبة لك أن تس	ُن تستكملي النقا	ط التالية		
قد أكون حاملاً بالفعل الآن (مارست الجنس دون وقاية/نسيت تناول القرص) أنا مُدخنة (أدخن بانتظام و/أو في المناسبات) لديّ نزيف مهبلي غير منتظم (نزيف بين دورات الحيض) أنا مصابة، أو سبق وأن أصبت، بجلطات الدم أو أحد اضطرابات التخثر المعروفة صبق وأن أصبت بسكتة دماغية أو نوبة قلبية. أعاني من ارتفاع في ضغط الدم (أو أتناول أدوية ضغط الدم) أعاني من مرض ما في الكبد أو القناة الصفراوية حاليًا ومن قبل أعاني من مرض السكري أعاني من الصداع النصفي أعاني من الصداع النصفي أعاني من الصداع النصفي أنا مصابة (أو يحتمل أن أكون مصابة) بعدوى في الجهاز التناسلي (مثل الكلاميديا) أنا أمابة (أو يحتمل أن أكون مصابة) بعدوى في الجهاز التناسلي (مثل الكلاميديا) إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو الدواء (يرجى كتابة سبب تناوله إذا كنت لا نستطيعين تذكر الاسم): مستكمل بواسطة الطبيب/ممرضة الصحة العامة/القابلة: وسيلة منع الحمل المُختارة:		ע	لا نعم	غبر متأكد		
لديّ نزيف مهبلي غير منتظم (نزيف بين دورات الحيض) أنا مصابة، أو سبق وأن أُصبت، بجلطات الدم أو أحد اضطرابات التختر المعروفة أصيب أحد أفراد أسريّ من الدرجة الأولى (أمر، أب، أخ أو أخت) بجلطات قبل سن 45 عامًا. مبق وأن أُصبت بسكتة دماغية أو نوبة قلبية. أعاني من ارتفاع في ضغط الدم (أو أتناول أدوية ضغط الدم) اعاني من مرض ما في الكبد أو القناة الصفراوية حاليًا ومن قبل اعاني من مرض السكري أعاني من الصداع النصفي أعاني من الصداع النصفي أعاني من الصداع النصفي وضعت مولودًا قبل أقل من سنة أسابيع/أنا أرضع الآن إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو الدواء (يرجى كتابة سبب تناوله إذا كنت لا تستطيعين تذكر الاسم): مستكمل بواسطة الطبيب/ممرضة الصحة العامة/القابلة: وسيلة منع الحمل المُختارة:	قد أكون حاملاً بالفعل الآن (مارست الجنس دون وقاية/نسيت ن	رنسيت تناول القرص)				
أنا مصابة، أو سبق وأن أُصبت، بجلطات الدم أو أحد اضطرابات التخثر المعروفة أصيب أحد أفراد أسر في من الدرجة الأولى (أم، أب، أخ أو أخت) بجلطات قبل سن 45 عامًا. سبق وأن أُصبت بسكتة دماغية أو نوية قلبية. أعاني من ارتفاع في ضغط الدم (أو أتناول أدوية ضغط الدم) العاني من مرض ما في الكبد أو القناة الصفراوية حاليًا ومن قبل العبق وأن أُصبت بسرطان الثدي العاني من مرض السكري أعاني من مرض السكري أعاني من الصداع النصفي أعاني من الصداع النصفي النا مصابة (أو يحتمل أن أكون مصابة) بعدوى في الجهاز التناسلي (مثل الكلاميديا) وضعت مولودًا قبل أقل من ستة أسابيع/أنا أرضع الآن إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو الدواء (يرجى كتابة سبب تناوله إذا كنت لا تستطيعين تذكر الاسم): يشتكمل بواسطة الطبيب/ممرضة الصحة العامة/القابلة: وسيلة منع الحمل المُختارة:	أنا مُدخنة (أدخن بانتظام و/أو في المناسبات)					
أصيب أحد أفراد أسرق من الدرجة الأولى (أم، أب، أخ أو أخت) بجلطات قبل سن 45 عامًا. سبق وأن أصبت بسكتة دماغية أو نوبة قلبية. أعاني من ارتفاع في ضغط الدمر (أو أتناول أدوية ضغط الدم) سبق وأن أصبت بسرطان الثدي سبق وأن أصبت بسرطان الثدي أعاني من مرض السكري أعاني من الصداع النصفي أنا مصابة (أو يحتمل أن أكون مصابة) بعدوى في الجهاز التناسلي (مثل الكلاميديا) وضعت مولودًا قبل أقل من ستة أسابيع/أنا أرضع الآن إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو الدواء (يرجى كتابة سبب تناوله إذا كنت لا تستطيعين تذكر الاسم): تشتكمل بواسطة الطبيب/ممرضة الصحة العامة/القابلة: وسيلة منع الحمل المُختارة:	لديّ نزيف مهبلي غير منتظم (نزيف بين دورات الحيض)	(
سبق وأن أصبت بسكتة دماغية أو نوية قلبية. العاني من ارتفاع في ضغط الدم (أو أتناول أدوية ضغط الدم) العاني من مرض ما في الكبد أو القناة الصفراوية حاليًا ومن قبل سبق وأن أصبت بسرطان الثدي اعاني من مرض السكري اعاني من الصداع النصفي اغاني من الصداع النصفي انا مصابة (أو يحتمل أن أكون مصابة) بعدوى في الجهاز التناسلي (مثل الكلاميديا) وضعت مولودًا قبل أقل من ستة أسابيع/أنا أرضع الآن إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو الدواء (يرجى كتابة سبب تناوله إذا كنت لا تستطيعين تذكر الاسم): لشتكمل بواسطة الطبيب/ممرضة الصحة العامة/القابلة: وسيلة منع الحمل المُختارة:	أنا مصابة، أو سبق وأن أُصبت، بجلطات الدم أو أحد اضطرابا	ضطرابات التخثر المعروفة				
أعاني من ارتفاع في ضغط الدم (أو أتناول أدوية ضغط الدم) أعاني من مرض ما في الكبد أو القناة الصفراوية حاليًا ومن قبل سبق وأن أُصبت بسرطان الثدي أعاني من مرض السكري أعاني من الصداع النصفي أنا مصابة (أو يحتمل أن أكون مصابة) بعدوى في الجهاز التناسلي (مثل الكلاميديا) وضعت مولودًا قبل أقل من ستة أسابيح/أنا أرضع الآن أنا أتناول دواءً إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو الدواء (يرجى كتابة سبب تناوله إذا كنت لا تستطيعين تذكر الاسم): تُسْتكمل بواسطة الطبيب/ممرضة الصحة العامة/القابلة: وسيلة منع الحمل المُختارة:	أصيب أحد أفراد أسرتي من الدرجة الأولى (أمر، أب، أخ أو أخت	أو أخت) بجلطات قبل سن 45 عامًا.				
أعاني من مرض ما في الكبد أو القناة الصفراوية حاليًا ومن قبل سبق وأن أُصبت بسرطان الثدي أعاني من مرض السكري أعاني من مرض السكري أعاني من الصداع النصفي أنا مصابة (أو يحتمل أن أكون مصابة) بعدوى في الجهاز التناسلي (مثل الكلاميديا) وضعت مولودًا قبل أقل من ستة أسابيع /أنا أرضع الآن أنا أتناول دواءً إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو الدواء (يرجى كتابة سبب تناوله إذا كنت لا تستطيعين تذكر الاسم): تُسْتكمل بواسطة الطبيب/ممرضة الصحة العامة/القابلة: وسيلة منع الحمل المُختارة:	سبق وأن أُصبت بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.					
سبق وأن أُصبت بسرطان الثدي العالم الثدي العالم الثدي العالم التعليم مرضة الصحة العامة	أعاني من ارتفاع في ضغط الدمر (أو أثناول أدوية ضغط الدمر)	لدم)				
أعاني من مرض السكري أعاني من الصداع النصفي أعاني من الصداع النصفي أعاني من الصداع النصفي أنا مصابة (أو يحتمل أن أكون مصابة) بعدوى في الجهاز التناسلي (مثل الكلاميديا) وضعت مولودًا قبل أقل من ستة أسابيع/أنا أرضع الآن أنا أتناول دواءً أنا أتناول دواءً إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو الدواء (يرجى كتابة سبب تناوله إذا كنت لا تستطيعين تذكر الاسم): تُسْتكمل بواسطة الطبيب/ممرضة الصحة العامة/القابلة: وسيلة منع الحمل المُختارة:	أعاني من مرض ما في الكبد أو القناة الصفراوية حاليًا ومن قبل	ن قبل				
أعاني من الصداع النصفي أنا مصابة (أو يحتمل أن أكون مصابة) بعدوى في الجهاز التناسلي (مثل الكلاميديا) وضعت مولودًا قبل أقل من ستة أسابيع/أنا أرضع الآن أنا أتناول دواءً إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو الدواء (يرجى كتابة سبب تناوله إذا كنت لا تستطيعين تذكر الاسم): تُستكمل بواسطة الطبيب/ممرضة الصحة العامة/القابلة: وسيلة منع الحمل المُختارة:	سبق وأن أُصبت بسرطان الثدي					
أنا مصابة (أو يحتمل أن أكون مصابة) بعدوى في الجهاز التناسلي (مثل الكلاميديا) وضعت مولودًا قبل أقل من ستة أسابيع/أنا أرضع الآن أنا أتناول دواءً إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو الدواء (يرجى كتابة سبب تناوله إذا كنت لا تستطيعين تذكر الاسم): تُستكمل بواسطة الطبيب/ممرضة الصحة العامة/القابلة:	أعاني من مرض السكري					
وضعت مولودًا قبل أقل من ستة أسابيح/أنا أرضع الآن أنا أتناول دواءً أنا أتناول دواءً إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو الدواء (يرجى كتابة سبب تناوله إذا كنت لا تستطيعين تذكر الاسم): تُسْتكمل بواسطة الطبيب/ممرضة الصحة العامة/القابلة: وسيلة منع الحمل المُختارة:	أعاني من الصداع النصفي					
أنا أتناول دواءً الإجابة بنعم، فما هو الدواء (يرجى كتابة سبب تناوله إذا كنت لا تستطيعين تذكر الاسم):	أنا مصابة (أو يحتمل أن أكون مصابة) بعدوى في الجهاز التناسل	التناسلي (مثل الكلاميديا)				
إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو الدواء (يرجى كتابة سبب تناوله إذا كنت لا تستطيعين تذكر الاسم): تُستكمل بواسطة الطبيب/ممرضة الصحة العامة/القابلة: التاريخ:	وضعت مولودًا قبل أقل من ستة أسابيع/أنا أرضع الآن					
تُستكمل بواسطة الطبيب/ممرضة الصحة العامة/القابلة: التاريخ:وسيلة منع الحمل المُختارة:	أنا أتناول دواءً					
التاريخ: وسيلة منع الحمل المُختارة:	إذا كانت الإجابة بنعمر، فما هو الدواء (يرجى كتابة سبب تنا	سبب تناوله إذا كنت لا تستطيعين تذكر الاسم):				
التاريخ: وسيلة منع الحمل المُختارة:						
التاريخ: وسيلة منع الحمل المُختارة:	تُستكمل بواسطة الطبب√ممرضة الصحة العامة√القابلة:					
		_				

الاسمر:_____

نموذج إقرار شخصي

Sex og samfunn

Trondheimsveien 2, Building B, 0560 Oslo

رقم الهاتف: 00 99 99 22 البريد الإلكتروني: post@sexogsamfunn.no www.sexogsamfunn.no

